

TA-SERVICE s.r.o. pořádá ve spolupráci
s OSL ČLK Brno-město, AKL a AKP

Pokročilý kurz Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc a jiné mozkové neurodegenerace

22. - 23. října 2026

Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

Program



**European
Reference
Networks**

for rare or low prevalence
complex diseases



Network

Neurological Diseases
(ERN-RND)

Čtvrtek 22. října 2026

- 08:45 - 09:00 Zahájení kurzu
M. Bareš, M. Brázdil, I. Rektorová
- 09:00 - 11:00 **Mozkové degenerace a diagnostika**
- 09:00 - 09:25 Genetika Alzheimerovy nemoci:
od ApoE po celogenomové sekvenování
S. Šutovský
- 09:25 - 09:50 Izolovaná porucha chování v REM spánku
a prodromální synukleinopatie
P. Dušek
- 09:50 - 10:15 Představení třetí verze neuropsychologické baterie
Uniform Data Set pro vyšetření kognice u Alzheimerovy
nemoci a onemocnění s Lewyho tělísky
T. Nikolai
- 10:15 - 10:40 Neurobiologický podklad sdělování nepříznivých zpráv
R. Rusina
- 10:40 - 11:00 Q & A
- 11:00 - 11:30 **Coffee Break**
- 11:30 - 13:00 **Jiné degenerace a diferenciální diagnostika**
- 11:30 - 11:55 Alzheimerova nemoc a LATE: diagnostické přístupy
J. Laczó
- 11:55 - 12:20 Překryv Movement Disorders s funkčními poruchami
hybnosti u dětí
P. Danhofer
- 12:20 - 12:45 Třes u degenerací a diferenciální diagnostika
M. Bočková
- 12:45 - 13:00 Q & A
- 13:00 - 14:30 **Oběd**

- 14:30 - 15:45 **WORKSHOP s PANELOVOU DISKUSÍ:
Nová biologická léčba Alzheimerovy nemoci**
- 14:30 - 14:55 Role neuropsychologie v éře biomarkerů
a antiamyloidové léčby
M. Vyhnálek
- 14:55 - 15:20 Krvné biomarkery v diagnostice predklinické a klinické
ALzheimerovy choroby: Nadej a nástrahy
N. Žilka
- 15:20 - 15:45 Současné trendy v biologické léčbě Alzheimerovy nemoci
L. Krajčovičová
- 15:45 - 16:45 **Nová biologická léčba Alzheimerovy nemoci:
PANELOVÁ DISKUSE**
Moderuje: I. Rektorová
*Členové panelu: N. Žilka, L. Krajčovičová, J. Laczó,
M. Vyhnálek, T. Nikolai, M. Bida (Eisai), P. Soukup (Eli Lilly)*
- 18:00 **Diskuzní večeře**
pro všechny účastníky



Nyní mohu více.

Duodopa SC® významně zlepšuje stavy „Off“ a „On“ bez obtěžující dyskineze a kvalitu spánku u mladších pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí.¹

Reference: 1. Antonini A, et al. Foslevodopa/Foskarbidopa in Younger Patients Earlier Within Advanced Parkinson's Disease: Post Hoc Analysis of a Randomized Trial. *Neurol Ther.* Published online December 1, 2025.

Zkrácené informace o léčivém přípravku

Název: Duodopa SC 240 mg/ml + 12 mg/ml infuzní roztok. **Složení:** Jeden ml obsahuje 240 mg foslevodopu a 12 mg foskarbidopu. **Indikace:** Léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, která reaguje na léčbu levodopou a je doprovázena těžkými motorickými fluktuacemi a hyperkinezí nebo dyskinezí, pokud dostupné kombinace antiparkinsonik neposkytují uspokojivé výsledky. **Dávkování:** Duodopa SC se podává jako kontinuální subkutánní infuze, 24 hodin denně. Doporučená počáteční rychlost infuze přípravku Duodopa SC se stanoví přepočtem denního příjmu levodopy na ekvivalenty levodopy (LE) pomocí příslušných koeficientů násobících dávkou (pro výpočet se bere v úvahu pouze levodopa a inhibitory COMT) a následným výpočtem zohledňujícím vyšší biologickou dostupnost subkutánní levodopy, poměr molekulových hmotností foslevodopy a levodopy, obsah foslevodopy v 1 ml a počet hodin bdělosti použitý pro stanovení LE. Dávku lze upravit tak, aby bylo dosaženo klinické odpovědi, která maximalizuje funkční „on“ periodu a minimalizuje počet a trvání „off“ period a „on“ period s obtěžující dyskinezí. Maximální doporučená denní dávka foslevodopy je 6 000 mg (nebo 25 ml přípravku Duodopa SC denně, což odpovídá přibližně 4 260 mg levodopy denně). **K zahájení** léčby přípravkem Duodopa SC je také potřebné určit objem nasycovací dávky. Pumpa umožňuje naprogramovat 2 alternativní rychlosti infuze pro pacienta (nízká/vysoká). Pokud si zdravotnický pracovník umožní, mohou si pacienti sami podat extra dávku ke zvládnutí akutních „off“ příznaků, které se objeví během kontinuální infuze. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku; glaukom s uzavřeným úhlem; těžká srdeční selhání; akutní cévní mozková příhoda; těžká srdeční aritmie; současně užití neselektivních inhibitorů MAO a selektivních inhibitorů MAO typu A (jejich podávání musí být přerušeno min. dva týdny před zahájením léčby přípravkem Duodopa SC), stavů, za kterých jsou kontraindikovány látky s adrenergickým účinkem, např. feochromocytom, hyperthyroidismus a Cushingův syndrom. Jelikož levodopa může aktivovat rozvoj maligního melanomu, nesmí být přípravek Duodopa SC používán u pacientů s podezřelou nebo potvrzenou kožní lézí nebo s melanomem v anamnézě. **Zvláštní upozornění:** Duodopa SC se nedoporučuje k léčbě extrapyramidových účinků vyvolaných léky. Pacienti s těžkým kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, ledvinovým, jaterním nebo endokrinním onemocněním nebo s anamnézou vředové choroby nebo konvulzí mají být léčeni přípravkem Duodopa SC s opatrností. U pacientů s anamnézou infarktu myokardu, kteří mají zbytkové aritmie, má být pečlivě sledována srdeční činnost. U všech pacientů léčených přípravkem Duodopa SC má být pečlivě sledován rozvoj změn duševního stavu, deprese s tendencí k sebevraždě a jiných závažných duševních změn. Pacienti s duševní nebo současnou psychózou mají být léčeni s opatrností. Pacienti s chronickým glaukomem s otevřeným úhlem mají být léčeni přípravkem Duodopa SC s opatrností a pouze za předpokladu, že nitroční tlak je dobře kontrolován. Duodopa SC může vyvolat ortostatickou hypotenzi. Levodopa je spojována se somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku. Při náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen komplex příznaků podobných neuroleptickému malignímu syndromu. Pacienti mají být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. Dopaminový dysregulační syndrom je návyková porucha, která u některých pacientů léčených kombinací karbidopa/levodopa vede k nadměrnému užívání přípravku. Duodopa SC obsahuje hydrazin, který může být genotoxický a možná kancerogenní. Snížená schopnost zacházet se systémem pro podávání přípravku může způsobit komplikace. Takovým pacientům má asistovat pečovatel. Náhlé nebo postupné zhoršování bradykineze může být znamením obstrukce zařízení z jakýchkoli důvodů, a je třeba to vyšetřit. U pacientů léčených kombinací přípravku s obsahem levodopy s karbidopou byla hlášena polyneuropatie. Duodopa SC obsahuje 42,4 mg (přibližně 1,84 mmol) sodíku v jednom ml. **Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:** Studie interakcí nebyly s přípravkem Duodopa SC prováděny. U generických kombinací levodopy s karbidopou jsou interakce obecně známý. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Údaje o podávání přípravku Duodopa SC těhotným ženám nejsou k dispozici. Podávání v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci, se nedoporučuje. Levodopa je vylučována do lidského mateřského mléka. Kojení má být během léčby přípravkem Duodopa SC přerušeno. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Levodopa a karbidopa mohou vyvolat závratě a ortostatickou hypotenzi. Proto má být řízení a obsluha strojů vykonávána s opatrností. **Nežádoucí účinky:** Velmi časté: flegmóza, infekce, erupce, uvolnění, edém, bolest a reakce v místě podání infuze, infekce močových cest, úzkost, deprese, halucinace, pád. Časté: absces v místě podání infuze, anémie, snížená chuť k jídlu, abnormální sny, agitovanost, stav zmatenosti, bludy, impulzivní porucha, insomnie, paranoia, psychotická porucha, spánkové ataky, porucha spánku, suicidální představa, kognitivní porucha, závrat, posturální závrat, dyskineze, dystonie, bolest hlavy, hyperstezie, „on“ a „off“ fenomén, parestázie, polyneuropatie, somnolence, synkopa, tremor, nepravidelná srdeční frekvence, hypertenze, hypotenze, ortostatická hypotenze, dyspnoe, orofaryngeální bolest, břišní distenze, bolest břicha, zácpa, průjem, sucho v ústech, dysgezie, dyspepsie, dysfagie, flatulence, nauzea, zvracení, kontaktní dermatitida, hyperhidróza, pruritus, vyrážka, svalové křeče, bolest šíje, inkontinence moči, retence moči, astenie, únava, malátnost, periferní edémy, bolest, následující reakce v místě podání infuze: modřina, exfoliace, extravazace, hematom, květenství, indurace, zánět, podráždění, rozstřískání, papulita, pruritus, vyrážka, otok, zvýšená hladina aminokyselin, zvýšená hladina kyseliny močové, snížená hladina vitamínu B6, deficienze vitamínu B12, snížení nebo zvýšení tělesné hmotnosti. **Použitelnost:** Neotevřené: 20 měsíců. Přípravek musí být použit do 24 hodin po přenesení z injekční lahvičky do stříkačky. **Uchovávání:** Uchovávejte a převážejte v chladu (2 °C – 8 °C). Uchovávejte injekční lahvičky v krabici, aby byly chráněny před rozbitím. Mohou být uchovávány při pokojové teplotě do maximálně 30 °C po jedno období v délce až 28 dní. **Balení:** 7 injekčních lahviček po 10 ml. **Držitel rozhodnutí o registraci:** AbbVie s.r.o., Praha, Česká republika. **Registrační číslo:** 27/341/21-C. **Datum poslední revize SmPC:** 9. 11. 2023. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen smluvním zdravotnickým zařízením z veřejného zdravotního pojištění. *Seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku dříve, než jej předepíšete.*

AbbVie s.r.o., Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5. Tel: 233 098 111, www.abbvie.cz

Pátek 23. října 2026

09:00 - 10:30 **Parkinsonova nemoc: pokročilé terapie**

09:00 - 09:25 Praktické aspekty adaptivní DBS pro pacienta s Parkinsonovou nemocí

M. Baláž

09:25 - 09:50 Pumpové systémy v léčbě Parkinsonovy nemoci: Praktické zkušenosti

P. Havráňková

09:50 - 10:15 Indikace a sledování pacientů na léčbě z pohledu psychiatra

T. Uhrová

10:15 - 10:30 Q & A

10:30 - 11:00 **Coffee Break**

11:00 - 12:00 **Zobrazování synukleinopatií**

11:00 - 11:25 DaTSCAN: novinky, limity a praktické implikace

P. Dušek

11:25 - 11:50 Novinky v zobrazování synukleinopatií pomocí MRI

I. Rektorová

11:50 - 12:00 Q & A

12:00 **Závěr kurzu**

I. Rektorová

12:00 - 13:00 **Oběd**

Partneři

Stříbrný partner

abbvie

Vystavovatel

MagnaPharm s.r.o.

E&H Services a.s.

Eisai GesmbH, org. sl.

Eli Lilly ČR s.r.o.

DEYMED Diagnostic s.r.o.


Trepp_Bio, s.r.o.

Medtronic Czechia s.r.o.

Společnost Parkinson, z. s.

STADA Pharma CZ s.r.o.

Plán konferenčních prostor



Pokročilý kurz Alzheimerova nemoc,
Parkinsonova nemoc a jiné mozkové neurodegenerace

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
2026

